

แบบฝึกหัดที่ 1.2 การให้คำแนะนำแนวทางการจัดการโรคฟันผุ ตามระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ หากท่านประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กแล้วพบว่า เด็กมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ ท่านจะวางแผนการนัดตรวจติดตามที่เหมาะสมสำหรับ เด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง รายนี้อย่างไรบ้าง

แนวทางปฏิบัติในการจัดการโรคฟันผุตามระดับความเสี่ยง กรณีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ

	แนวทางปฏิบัติในการจัดการโรคฟันผุ
1. การตรวจติดตาม	1. 3-4 เดือน 2. 4-6 เดือน 3. 6-12 เดือน
2. การถ่ายภาพรังสีด้านประชิด	1. 6-18 เดือน 2. 18-24 เดือน 3. 2-3 ปี
3. การแนะนำให้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์วันละ 2 ครั้ง	1. แนะนำ 2. ไม่แนะนำ
4. การเลือกใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่โดยทันตแพทย์ เช่น ฟลูออไรด์เจล หรือ ฟลูออไรด์วานิช	1. ไม่จำเป็น 2. ทุก 6 เดือน 3. ทุก 3 เดือน
5. ฉายน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ 0.05% โซเดียมฟลูออไรด์ หรือ หมากฝรั่งที่มีส่วนผสมของไฮลิทอล อย่างน้อยวันละ 6-10 กรัม	1. ไม่จำเป็น 2. แนะนำเป็นทางเลือก