

การเปรียบเทียบ ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ระดับประเทศ ครั้งที่ 2-7

ตารางที่ 5.1 ผลการสำรวจทันตสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย ตามตัวชี้วัดหลักขององค์การอนามัยโลก

กลุ่มอายุ	เป้าหมาย	ผลการสำรวจ ตามปีที่สำรวจ					
		2527	2532	2537	2543-44	2550	2555
5-6 ปี	ร้อยละผู้ปราศจากฟันผุ	25.6	17.2	14.8	12.6	19.4*	21.5
12 ปี	ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (ซี่ต่อคน)	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.3
	สภาวะปริทันต์ปกติ (ส่วน)	1.5	1.4	1.4	1.9	2.8	4.1
18 ปี	ร้อยละของผู้มีฟันครบ 28 ซี่	65.0	79.0	66.5	71.4**	72.3	81.0
	สภาวะปริทันต์ปกติ (ส่วน)	0.9	1.3	1.1	1.4**	2.5	3.6
35-44 ปี	ร้อยละผู้มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่	92.7	91.7	91.9	92.3	96.2	97.8
60-74 ปี	ร้อยละผู้มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่	47.2	40.8	47.7	49.0	54.8	57.8

* เริ่มกลุ่มอายุ 5 ปี

** เริ่มกลุ่มอายุ 15 ปี

ตารางที่ 5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ปราศจากโรคฟันผุในฟันน้ำนม จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ร้อยละของเด็กที่ปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม				
		2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		33.5	38.3	33.3	38.6	48.3
	เมือง	37.4	40.6	36.0	44.9	51.2
	ชนบท	33.2	32.2	29.7	32.8	44.7
	กทม.	33.3	51.5	62.5	60.7	50.5
กลาง		17.4	29.6	32.3	30.2	40.4
เหนือ		33.6	39.6	33.0	43.5	54.0
ตอ-น.		43.3	41.9	29.9	38.4	50.8
ใต้		26.4	33.8	28.8	36.0	39.0

ตารางที่ 5.3 สภาวะโรคฟันผุในฟันน้ำนม ในเด็กอายุ 3 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ความชุกของโรคฟันผุในฟันน้ำนม				
		2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		66.5	61.7	65.7	61.4	56.7
	เมือง	62.6	59.4	64.0	55.1	48.8
	ชนบท	66.8	67.8	70.3	67.2	55.3
	กทม.	66.7	48.5	37.5	39.3	49.5
กลาง		82.6	70.4	67.7	69.8	59.6
เหนือ		66.4	60.4	67.0	56.5	46.0
ตอ-น.		56.7	58.1	70.1	61.6	49.2
ใต้		73.6	66.8	71.2	64.0	61.0

ตารางที่ 5.4 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (ซี่ต่อคน) ในฟันน้ำนม ของเด็กอายุ 3 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (ซี่ต่อคน)				
		2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		4.0	3.4	3.6	3.2	2.7
	เมือง	3.9	3.2	3.6	2.7	2.4
	ชนบท	3.9	3.8	4.0	3.6	2.8
	กทม.	4.3	2.3	1.5	2.0	3.0
กลาง		5.2	4.2	3.8	3.6	3.0
เหนือ		3.8	3.1	3.8	3.1	1.7
ตอ-น.		3.2	3.0	3.9	2.9	2.4
ใต้		4.4	3.9	4.0	4.0	3.1

ตารางที่ 5.5 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ปราศจากโรคฟันผุในฟันน้ำนม จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ร้อยละของเด็กที่ปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม					
		2527**	2532*	2537*	2543-44**	2550	2555
ประเทศ		25.6	17.2	14.7	12.5	19.4	21.5
	เมือง	6.1	6.7	6.7	13.8	28.5	28.4
	ชนบท	28.4	19.5	19.5	10.9	11.5	17.4
	กทม.	6.2	6.5	6.5	21.1	41.7	23.9
กลาง		11.1	4.5	4.5	11.9	13.4	17.4
เหนือ		25.2	13.9	13.9	14.2	23.7	24.5
ตอ-น.		42.6	32.9	32.9	11.0	16.4	23.8
ใต้		5.6	8.5	8.5	8.5	14.5	16.6

* 6 ปี

** 5-6 ปี

ตารางที่ 5.6 สภาวะโรคฟันผุในฟันน้ำนม ในเด็กอายุ 5 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ความชุกของโรคฟันผุในฟันน้ำนม					
		2527	2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		74.4	83.1	85.1	87.4	80.6	78.5
	เมือง	93.9	93.4	88.5	86.1	71.5	71.6
	ชนบท	71.6	80.8	84.1	89.0	88.5	82.6
	กทม.	93.8	93.5	83.7	78.6	58.3	76.1
กลาง		88.9	94.4	92.7	87.9	83.6	82.6
เหนือ		74.8	86.1	78.8	85.7	76.3	75.5
ตอ-น.		57.4	65.5	81.0	89.0	83.6	76.2
ใต้		94.4	91.5	92.9	91.4	85.5	83.4

ตารางที่ 5.7 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (ซี่ต่อคน) ในฟันน้ำนม ของเด็กอายุ 5 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (ซี่ต่อคน)					
		2527	2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		-	5.6	5.7	6.0	5.4	4.4
	เมือง	-	6.9	6.1	5.7	4.3	3.8
	ชนบท	-	5.2	5.7	6.2	6.4	4.9
	กทม.	-	6.5	4.5	4.9	3.2	4.9
กลาง		-	6.9	6.8	5.8	6.0	4.6
เหนือ		-	5.8	5.0	5.7	4.8	3.0
ตอ-น.		-	3.6	5.0	6.2	5.2	4.3
ใต้		-	7.0	6.9	6.9	6.8	5.0

ตารางที่ 5.8 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ที่มีฟันแท้ จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ร้อยละของเด็กที่มีฟันถาวร					
		2527	2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		45.8	49.2	53.9	57.3	56.9	52.3
	เมือง	70.8	69.2	62.5	62.7	55.9	50.5
	ชนบท	41.0	44.7	48.2	54.3	59.3	56.9
	กทม.	80.0	77.9	77.4	66.0	48.0	44.7
กลาง		62.5	61.4	65.7	58.8	64.4	52.9
เหนือ		41.7	48.1	49.0	58.2	62.5	52.8
ตอ-น.		18.7	33.1	45.3	50.3	51.1	56.9
ใต้		48.4	62.8	69.2	64.8	57.6	55.4

ตารางที่ 5.9 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ในเด็กอายุ 12 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (ซี่ต่อคน)					
		2527	2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.3
	เมือง	2.6	2.5	1.9	1.9	1.5	1.0
	ชนบท	1.3	1.3	1.3	1.5	1.7	1.7
	กทม.	3.0	3.0	2.9	2.0	1.3	1.1
กลาง		2.3	1.8	1.9	1.6	2.0	1.3
เหนือ		1.4	1.5	1.3	1.7	1.8	1.3
ตอ-น.		0.5	0.8	1.3	1.4	1.3	1.8
ใต้		2.3	1.9	2.1	2.1	1.5	1.1

ตารางที่ 5.10 ร้อยละของผู้มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ในกลุ่มอายุ 35-44 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ร้อยละของผู้มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ กลุ่มอายุ 35-44 ปี					
		2527	2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		92.7	91.7	91.9	92.3	96.2	97.8
	เมือง	88.8	86.2	90.6	90.9	96.5	97.2
	ชนบท	94.2	92.9	92.7	93.3	96.7	97.9
	กทม.	83.8	87.1	89.6	88.8	92.8	98.5
กลาง		91.0	87.9	90.1	84.8	92.6	95.6
เหนือ		90.1	92.4	92.5	95.0	97.2	96.5
ตอ-น.		98.5	97.6	96.8	98.0	98.9	99.1
ใต้		92.4	88.5	88.4	89.3	96.8	98.4

ตารางที่ 5.11 ร้อยละของผู้มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ในกลุ่มอายุ 60-74 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ร้อยละของผู้มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ กลุ่มอายุ 60-74 ปี					
		2527	2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		47.2	40.8	47.7	49.0	54.8	57.8
	เมือง	42.4	26.6	40.8	43.6	48.5	48.3
	ชนบท	49.8	44.2	52.9	52.1	58.6	62.5
	กทม.	27.9	24.3	32.5	36.5	45.0	58.3
กลาง		42.3	27.7	29.7	36.6	41.6	46.7
เหนือ		47.2	38.0	61.3	55.1	55.2	64.0
ตอ-น.		59.6	62.0	64.0	59.8	69.9	69.8
ใต้		44.7	37.2	36.7	43.7	48.5	51.7

ตารางที่ 5.12 ร้อยละของผู้สูญเสียฟันทั้งปาก ในกลุ่มอายุ 60 – 74 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ
จำแนกตามภาค เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ร้อยละของผู้สูญเสียฟันทั้งปาก					
		2527	2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		16.2	20.6	16.3	8.2	10.5	7.2
	เมือง	18.5	27.7	16.7	10.0	11.8	8.7
	ชนบท	14.3	18.6	15.7	6.7	10.9	5.9
	กทม.	30.6	31.4	18.8	15.5	6.7	10.8
กลาง		20.6	30.0	29.2	13.2	19.7	7.3
เหนือ		14.7	20.2	9.1	5.9	5.7	4.7
ตอ-น.		6.2	7.1	3.3	2.9	8.7	3.7
ใต้		19.9	26.2	25.8	10.2	9.8	11.2

ตารางที่ 5.13 ร้อยละของผู้มีเหงือกอักเสบในเด็กอายุ 12 ปี จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามภาค
เขต และปีที่สำรวจ

ภาค	เขต	ร้อยละของผู้มีเหงือกอักเสบ				
		2532	2537	2543-44	2550	2555
ประเทศ		60.1	75.3	76.9	58.9	50.3
	เมือง	-	72.6	83.6	61.2	52.9
	ชนบท	-	77.8	84.5	61.7	58.7
	กทม.	-	60.4	14.2	45.1	30.1
กลาง		-	71.1	80.8	68.9	32.1
เหนือ		-	71.2	84.1	60.0	52.9
ตอ-น.		-	83.9	86.1	54.8	72.1
ใต้		-	79.0	85.4	60.3	61.6

ตารางที่ 5.14 ร้อยละของผู้มีสภาวะปริทันต์ โดยคิดจากระดับสูงสุดของโรคในแต่ละคนตามดัชนี CPI จาก การสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามกลุ่มอายุ และปีที่สำรวจ

อายุ	ปีที่สำรวจ	ร้อยละของผู้มีสภาวะปริทันต์					
		ปกติ (CPI =0)	เลือดออก (CPI =1)	หินน้ำลาย (CPI =2, 5)	หินน้ำลาย ที่มี เลือดออก (CPI =5)	ร่องลึกปริ ทันต์ 4-5 ม.ม. (CPI =3)	ร่องลึกปริ ทันต์ >=6 ม.ม. (CPI =4)
12 ปี	2527	5.9	2.2	84.4	-	7.4	0.1
	2532	6.2	4.6	89.1	-	0	0
	2537	2.3	9.8	87.5	74.9	0.4	0
	2543-2544	9.5	17.4	73.1	59.5	0	0
	2550	18	23.2	58.1	35.7	0.2	0.6
	2555	29.9	29.6	40.6	20.7	-	-
17-19 ปี	2527	1.3	0.7	82.7	-	14.5	0.7
	2532	3.4	2.6	87.3	-	6.7	0
	2537	2.4	3.2	88.2	-	5.8	0.4
15 ปี	2543-2544	3.8	12.8	82.2	72.6	1	0.1
	2550	13.9	15.9	69.8	45.1	0	0.4
	2555	21.6	23.3	55.1	30.3	0.1	-
35-44 ปี	2527	0.3	0	41.5	-	46.9	11.3
	2532	0.8	0.2	53.4	-	34.5	10.8
	2537	0.7	0.9	40.8	-	38.1	19.5
	2543-2544	1.8	3.2	57.7	-	26.8	10.5
	2550	6.6	3.6	47.3	-	22.1	15.5
	2555	14.1	8.4	61.8	30.9	10.9	4.7
60-74 ปี	2527	0	0	15.8	-	56.4	27.7
	2532	0.6	0.7	27.5	-	47.9	23.3
	2537	0.8	0.5	24.3	-	41.3	33.1
	2543-2544	1.2	1.1	36.1	-	35.9	25.7
	2550	1.8	0.4	5.0	-	15.4	68.8
	2555	11.5	4.5	39.6	19.9	20.7	11.4

ตารางที่ 5.15 ค่าเฉลี่ยส่วนของช่องปากที่มีสภาวะปริทันต์ตามระดับความรุนแรง วัดด้วยดัชนี CPI จากการสำรวจระดับประเทศ จำแนกตามกลุ่มอายุ และปีที่สำรวจ

อายุ	ปีที่สำรวจ	ค่าเฉลี่ยส่วนของช่องปาก (ส่วน)							
		ปกติ (CPI =0)	เลือดออก (CPI =1)	หิน น้ำลาย (CPI =2, 5)	หินน้ำลาย ที่มี เลือดออก (CPI =5)	ร่องลึกปริ ทันต์ 4-5 ม.ม. (CPI =3)	ร่องลึกปริ ทันต์ ≥6ม.ม. (CPI =4)	Missing Sextant	
12 ปี	2527	1.5	0.4	3.6	-	0.1	0	0.4	
	2532	1.4	0.8	3.6	-	0	0	0.2	
	2537	1.4	1.1	5.5	2.0	0	0	0	
	2543- 2544	1.9	1.5	2.5	1.6	0	0	0	
	2550	2.8	1.6	2.0	1.3	1.3	0	0	
	2555	4.1	1.2	0.7	0.4				
17-19 ปี	2527	0.9	0.2	4.6	-	0.3	0	0	
	2532	1.3	0.5	4	-	0	0	0.2	
	2537	1.1	0.5	4.3	-	0.1	0	0	
15 ปี	2543- 2544	1.4	1.4	3.2	2.2	0	0	0	
	2550	2.5	1.3	2.2	1.3	1.3	0	0	
	2555	3.6	1.1	1.3	0.8				
	35-44 ปี	2527	0.2	0	3.8	-	1.6	0.2	0.2
		2532	0.4	0.1	4	-	1.1	0.2	0.2
	2537	0.5	0.2	3.4	-	1.3	0.4	0.2	
	2543- 2544	0.6	0.6	3.6	2.2	0.8	0.2	0.2	
	2550	1.4	0.6	2.9	1.6	0.8	0.2	0.2	
	2555	2.8	0.7	1.9	0.9	0.3	0.1	0.2	
60-74 ปี	2527	0	0	1.3	-	1.7	0.4	2.6	
	2532	0.1	0	1.8	-	1.2	0.3	2.6	
	2537	0.1	0.1	2.0	-	1.1	0.5	2.2	
	2543- 2544	0.2	0.2	2.7	1.6	1.2	0.4	1.3	
	2550	0.3	0.1	1.7	0.9	0.5	0.4	3.9	
	2555	1.3	0.4	1.7	0.8	0.5	0.2	2.0	