



กรมอนามัย
สำนักทันตสาธารณสุข

การควบคุมโรคฟันผุในเด็กภายใต้สถานการณ์ COVID-19

การทา “ Silver Diamine Fluoride (SDF) ”



ข้อบ่งชี้

- เด็กที่มีข้อจำกัดในการทำหัตถการตามปกติ เช่น เด็กพิเศษ เด็กที่อ้าปากได้น้อย
- เด็กที่มีความเสี่ยงการเกิดฟันผุนรุนแรง หลายซี่ ไม่สามารถรักษาได้หมดในครั้งเดียว
- เด็กที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรับบริการทางทันตกรรม เช่น ในพื้นที่ชนบทห่างไกล



step 1

ทำความสะอาดฟัน
เพื่อกำจัดคราบ
จุลินทรีย์ด้วย
การขัดหรือแปรงฟัน



step 2

ทาวาสลินบริเวณ
รอบริมฝีปาก
และเหงือกบริเวณ
ใกล้เคียง



step 3

กับน้ำลายด้วยสำลี
หรือผ้าก๊อช



step 4

ใช้พู่กันขนาดเล็ก
ทา SDF บนรอยผุ
นาน 1 นาที



step 5

ใช้ผ้าก๊อชเช็ด SDF
ส่วนเกินออก
งดกับน้ำและอาหาร
นาน 30 นาที